



✓
Radicava, a
primeira molécula
aprovada desde 1996 para
tratamento
de pacientes
com ELA^{6,7}

A vida é feita de experiências.

E Radicava[®] permite que
seu paciente com ELA*
viva outras mais.¹

*Esclerose Lateral Amiotrófica

Perguntas Frequentes

1

Qual a indicação do uso de RADICAVA® (edaravona) em pacientes com ELA?

?

RADICAVA® (edaravona) é indicado para inibição da progressão do distúrbio funcional em pacientes com esclerose lateral amiotrófica (ELA).⁴

2

RADICAVA® (Endaravona) precisa ser infundido por bomba de infusão?

?

Não. **O medicamento pode ser infundido por via intravenosa.** É recomendado diluir a solução de RADICAVA® (2 ampolas) com aproximadamente 100ml de solução salina.⁴

3

Onde posso comprar RADICAVA® (Endaravona)?

?

Em deliveries homologadas pela Daiichi Sankyo:
➤ **Oncoprod:** <https://oncoprod.com/contato>
➤ **4Bio:** <https://www.4bio.com.br/contato/>

4

Por quanto tempo RADICAVA® deve ser administrado?

?

O médico deve conversar com cada paciente sobre a **duração do tratamento** com RADICAVA®.

★ ★ NOVIDADE!

Ferramentas de Auxílio no Diagnóstico de ELA*

Disponível online com pontuação automática ao final das respostas, e com opção de salvar em pdf.



Escala ALSFRS-R

Escala ALSFRS-R/BR, em sua versão adaptada para a língua portuguesa



Escala ALSAQ-40

Questionário de Qualidade de Vida em ELA - ALSAQ-40


*Esclerose Lateral Amiotrófica

Radicava[®]

(edaravona)


O medicamento que auxilia na inibição da progressão da perda funcional do **paciente com ELA.** ^{1,2}

- **RADICAVA[®] 30 mg/20 mL**;
- **Agente neuroprotetor** (sequestrante de radicais livres);
- **Administração intravenosa** com aproximadamente 100 mL de solução salina;
- **Dosagem: 60mg/dia = 60 minutos de administração diária em 100 mL de solução salina.**




Primeiro ciclo de tratamento

- **14 dias** de infusão
- **14 dias** de descanso



A partir do segundo ciclo

- **10 dias** de infusão
- **10 dias** de descanso



A Daiichi Sankyo preparou conteúdos importantes sobre o medicamento **Radicava (edaravona) para lhe auxiliar no manejo do seu paciente.**



Guia Radicava na Prática Clínica

- Tipos de ELA* e epidemiologia
- Mecanismo de ação do Radicava
- Eficácia e segurança de Radicava
- Perguntas Frequentes

*Esclerose Lateral Amiotrófica



Medpedia

Visite a página:
<http://medpedia.com.br/ela>
e baixe o Guia Radicava



**Paciente
360**



Medpedia

Acesse o site:
medpedia.com.br/ela

Uma plataforma inovadora de
simulação de casos clínicos
virtuais humanizados.

Programa VidaRara

Suporte ao paciente de
doenças raras Daiichi Sankyo

Nossos serviços:



Programa de Suporte ao Diagnóstico

Critérios de elegibilidade
para realização de exames
de diagnóstico
(eletroencefalografia).



Programa de Suporte ao Paciente

- * Informações sobre a doença;
- * Lembrete de infusão;
- * Orientações para BiPAP;
- * Suporte psicológico e nutricional.



Pacientes e Público Leigo

Pílulas de Saúde

Página sobre doenças raras



FaleSobreELA

Informações sobre ELA



Médicos

Medpedia

Conteúdos especiais para
apoiar a prática médica



Radicava[®]

(edaravona)

Radicava (edaravona). Indicações: inibição da progressão do distúrbio funcional em pacientes com esclerose lateral amiotrófica (ELA). **CONTRAINDICAÇÕES:** hipersensibilidade aos componentes da formulação. **Cuidados e advertências:** Os pacientes devem ser monitorados cuidadosamente pois pode ocorrer reação anafilática. O medicamento contém bissulfito de sódio, que pode causar reação do tipo alérgico. **Gravidez:** uso não recomendado. **Lactação:** a lactação durante o uso não deve ser permitida. **Interações medicamentosas:** o uso concomitante com antibióticos como cefazolina sódica, cloridrato de cefotiam e piperacilina sódica pode agravar o comprometimento renal. **Reações adversas:** erupção cutânea, eczema, glicosúria, contusão, distúrbios da marcha, cefaleia, distúrbios respiratórios, infecção por *Tinea*. **Posologia:** 60 mg de edaravona, administrados por infusão intravenosa durante 60 minutos. Ciclo inicial: administração diária por 14 dias, seguido de período de 14 dias sem administração. Ciclos subsequentes: administração diária por 10 dias em período de 14 dias, seguido de período de 14 dias sem administração. **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Reg MS.: 1.0454.0192. Registrado por:** Daiichi Sankyo Brasil Farmacêutica Ltda. Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800-055-6596. **SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. MB_01**

Referências bibliográficas: **1.** Writing Group; Edaravone (MCI-186) ALS 19 Study Group. Safety and efficacy of edaravone in well defined patients with amyotrophic lateral sclerosis: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *Lancet Neurol.* 2017 Jul;16(7):505-12. **2.** Brooks BR, Berry JD, Ciepielewska M, Liu Y, Zambrano GS, Zhang J, Hagan M. Intravenous edaravone treatment in ALS and survival: An exploratory, retrospective, administrative claims analysis. *EClinicalMedicine.* 2022 Aug 4;52:101590. **3.** Raras Por quê? Disponível em: <https://muitossomosraros.com.br/visao-geral/raras-porque/> Acesso em Julho/23. **4.** RADICAVA (edaravona). Bula do produto para o profissional da saúde.



Paixão pela Inovação.
Compromisso com os Pacientes.



2637 – dezembro/23
Material destinado à classe médica.