



Informações do medicamento Radicava (edaravona)

Indicação

RADICAVA® (edaravona) é indicado para inibição da progressão do distúrbio funcional em pacientes com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)¹

Apresentação

Cada embalagem contém duas ampolas com 30 mg de edaravona em 20 mL de solução injetável.¹



Armazenamento

RADICAVA® (edaravona) deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).¹

Administração

Diluir 2 ampolas (60 mg) da solução de Radicava em aproximadamente 100 mL de solução salina e administrar por infusão intravenosa durante 60 minutos.¹

Posologia

1º ciclo de tratamento¹

Administração diária por 14 dias, seguido de período de 14 dias sem administração do medicamento.¹

> 14 dias de infusão > 14 dias de descanso

A partir do 2º ciclo de tratamento¹

Administração diária por 10 dias em período de 2 semanas (14 dias), seguido de período de 14 dias sem administração do medicamento.¹

> 10 dias de infusão > 14 dias de descanso

Interações Medicamentosas

O uso concomitante de RADICAVA® (edaravona) com antibióticos como cefazolina sódica, cloridrato de cefotiam e piperacilina sódica pode agravar o comprometimento renal.¹

Não é recomendado que RADICAVA® seja misturado com preparações de nutrição parenteral total e/ou com infusões de aminoácidos, e não deve ser administrado através da mesma linha intravenosa que tais preparações.¹

Não é recomendado que RADICAVA® seja misturado com infusões de anticonvulsivantes, incluindo diazepam, fenitoína sódica ou canrenoato de potássio, já que a solução pode se tornar turva.¹



Radicava[®]

(edaravona)

Radicava (edaravona). Indicações: inibição da progressão do distúrbio funcional em pacientes com esclerose lateral amiotrófica (ELA). **CONTRAINDICAÇÕES:** hipersensibilidade aos componentes da formulação. **Cuidados e advertências:** Os pacientes devem ser monitorados cuidadosamente pois pode ocorrer reação anafilática. O medicamento contém bissulfite de sódio, que pode causar reação do tipo alérgico. **Gravidez:** uso não recomendado. **Lactação:** a lactação durante o uso não deve ser permitida. **Interações medicamentosas:** o uso concomitante com antibióticos como cefazolina sódica, cloridrato de cefotiam e piperacilina sódica pode agravar o comprometimento renal. **Reações adversas:** erupção cutânea, eczema, glicosúria, contusão, distúrbios da marcha, cefaleia, distúrbios respiratórios, infecção por *Tinea*. **Posologia:** 60 mg de edaravona, administrados por infusão intravenosa durante 60 minutos. Ciclo inicial: administração diária por 14 dias, seguido de período de 14 dias sem administração. Ciclos subsequentes: administração diária por 10 dias em período de 14 dias, seguido de período de 14 dias sem administração. **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Reg MS.: 1.0454.0192. Registrado por:** Daiichi Sankyo Brasil Farmacêutica Ltda. Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800-055-6596. **SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.** MB_01

Referências bibliográficas: 1- Radicava (edaravona). Bula do produto para profissional da saúde.

*Esclerose Lateral Amiotrófica



Paixão pela Inovação.
Compromisso com os Pacientes.



Tratando a humanidade,
1 caso por vez.



SAC
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800 055 6596
sac@dsbr.com.br

2830 - Março/24
Material destina à classe médica.